DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba

INFORME AGROMETEOROLÓGICO

Octubre 2026





A partir de los datos proporcionados por la Red de Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, presentamos el informe agrometeorológico que refleja el análisis de las variables temperaturas del aire y precipitaciones para la provincia de Córdoba en el mes de OCTUBRE del año 2026.

Para este informe se recopilaron datos mensuales de más de 100 Estaciones Meteorológicas automáticas, las cuales se encuentran distribuidas en la zona agrícola de la provincia.

Merecen especial reconocimiento los Referentes de las Estaciones Meteorológicas quienes brindan su colaboración para el cuidado de los equipos, sin lo cual no sería posible llevar adelante esta Red.

Nuestra Red de Estaciones Meteorológicas de la BCCBA puede ser consultada en: Acceso-Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba

ANÁLISIS DEL MES DE OCTUBRE DE 2026

Durante octubre de 2026, las precipitaciones se registraron en gran parte de la provincia de Córdoba, aunque con diferencias en los acumulados entre regiones. Los mayores registros se observaron en sectores del centro y sur provincial (Fig. 1 y Fig. 2). En comparación con octubre de 2025, las lluvias fueron más abundantes hacia el centro y norte, mientras que en el sudeste no se repitieron los elevados acumulados del año anterior. A nivel departamental, la variación respecto al promedio histórico fue heterogénea, con valores superiores a la media en departamentos como Santa María, Río Primero y Capital, mientras que otros presentaron registros inferiores (Tabla 1). En cuanto a la temperatura media del aire, octubre de 2026 presentó valores inferiores a los del mismo mes de 2025 en gran parte de la provincia, con las diferencias más marcadas hacia el centro y sur provincial (Fig. 3).

Reporte de lluvias (mm)




Figura 1. Mapa de precipitaciones acumuladas de octubre 2026 (https://bccba.org.ar/reporte-mensual-de-precipitaciones-octubre-2026 *).*

Departamento	Lluvia actual (mm)	Promedio Histórico (mm) *	Variación %
Calamuchita	61	69	-12 %
Capital	84	57	47 %
Colón	83	62	34 %
General Roca	107	95	13 %
Gral. San Martín	63	88	-28 %
Juárez Celman	62	91	-32 %
Marcos Juárez	98	97	1 %
Pte. Roque Sáenz Peña	58	93	-38 %
Río Cuarto	71	77	-8 %
Río Primero	87	57	53 %
Río Seco	59	47	26 %
Río Segundo	70	67	4 %
San Javier	20	36	-44 %
San Justo	61	76	-20 %
Santa María	119	61	95 %
Tercero Arriba	54	75	-28 %
Totoral	72	53	36 %
Tulumba	60	52	15 %
Unión	79	89	-11 %

*Datos correspondientes a la serie 2007–2025.

Tabla 1. Variación departamental de las lluvias con respecto al promedio (serie 2007-2025).

Acumulado de Precipitaciones (mm)




Figura 2. Isohietas del mes de octubre 2025 vs octubre 2026.

Temperatura Media (°C)




Figura 3. Isotermas del mes de octubre 2025 vs octubre 2026.

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

La comparación de las isohietas muestra una distribución diferente de las precipitaciones entre octubre de 2025 y 2026. Mientras que el año anterior los mayores acumulados se concentraron en el sudeste provincial, con registros que superaron los 150 mm, durante octubre de 2026 las lluvias estuvieron más repartidas, con valores entre 50 y 100 mm en buena parte del territorio. Respecto al promedio histórico 2007–2025 (Tabla 1), las mayores diferencias positivas se registraron en Santa María (+95 %), Río Primero (+53 %) y Capital (+47 %). En cambio, San Javier (-44 %), Presidente Roque Sáenz Peña (-38 %) y Juárez Celman (-32 %) presentaron los mayores déficits. Esto refleja un comportamiento variable de las precipitaciones durante el mes, con departamentos que superaron los valores históricos y otros que quedaron por debajo.




Figura 4. Precipitación media mensual de octubre (1991-2020) Fuente: Atlas Climático de Argentina-SMN.

La Figura 4 muestra que, históricamente, las precipitaciones de octubre aumentan desde el oeste hacia el este de Córdoba, donde los valores medios llegan a superar los 100 mm. En octubre de 2026, en cambio, las lluvias presentaron una distribución más pareja, con acumulados entre 50 y 100 mm en gran parte de la provincia. Respecto a la media histórica, los registros fueron cercanos a los habituales en buena parte del centro y oeste provincial, mientras que en algunos sectores del este resultaron inferiores. Hacia el sur, se observaron zonas con precipitaciones superiores a los valores medios del período.




Figura 5. Contenido de agua útil en el suelo a finales de octubre (SMN-UBA).

Hacia finales de octubre, el contenido de agua útil en el suelo presentó diferencias importantes entre la capa arable y el perfil. En superficie, las reservas fueron bajas en gran parte de Córdoba, especialmente hacia el norte y oeste provincial, mientras que en sectores del sudeste se observaron condiciones algo más favorables. En profundidad, la disponibilidad de agua fue mayor, principalmente hacia el este y sudeste, aunque con reservas más ajustadas en el resto del territorio. Esta situación resulta importante para los cultivos invernales, que atraviesan etapas de elevada demanda hídrica, y para el avance de la siembra de cultivos estivales, donde la humedad superficial es fundamental para lograr una buena implantación.

En cuanto a la temperatura media del aire, la Figura 3 muestra un descenso generalizado durante octubre de 2026 respecto al mismo mes del año anterior. Mientras que en octubre de 2025 predominaban valores cercanos a los 19 y 20 °C en gran parte de la provincia, durante el mes analizado las isotermas se ubicaron mayormente entre 15 y 17 °C. Las diferencias fueron más marcadas hacia el centro y sur provincial, aunque el descenso térmico se observó en todo el territorio cordobés.




Figura 6. Temperatura media mensual de octubre (1991-2020) Fuente: Atlas Climático de Argentina-SMN.

Respecto a la media histórica del Atlas Climático de Argentina del SMN para el período 1991–2020, octubre de 2026 también presentó temperaturas medias inferiores a los valores habituales en gran parte de Córdoba. Mientras que el mapa histórico muestra registros cercanos a los 18 y 20 °C en sectores del centro y norte provincial, durante este año predominaron valores entre 15 y 17 °C. Hacia el sur, las diferencias fueron menos marcadas, aunque también se observaron temperaturas por debajo de los valores medios en algunos sectores.




Figura 7. Temperaturas extremas registradas en el mes.

Por último, la Figura 7 presenta las temperaturas extremas registradas durante octubre por la REM de la BCCBA. Las máximas absolutas superaron los 34 °C en distintas localidades del norte y noreste provincial, destacándose Las Arrias con 35,7 °C. Por su parte, las mínimas más bajas se registraron hacia el sur y sudeste de Córdoba, con valores cercanos a 0 °C y un registro de -0,1 °C en Guatimozín. Estas condiciones reflejan la ocurrencia de jornadas cálidas y episodios de frío durante el mes, con heladas puntuales que pudieron afectar a los cultivos más sensibles.

TENDENCIA CLIMÁTICA: PRÓXIMO TRIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE-ENERO 2026/27




Figura 8. Pronóstico de precipitación y temperaturas, consenso NOVIEMBRE-DICIEMBRE-ENERO 2026/27 (tomado del SMN).

Para el trimestre noviembre-diciembre-enero 2026/27, el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional indica para gran parte de Córdoba una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal. En cuanto a las temperaturas, se prevén valores normales o inferiores a los normales, con mayor probabilidad de temperaturas inferiores en el centro y sur provincial. Esta información debe interpretarse como una tendencia estacional y complementarse con los pronósticos de corto plazo.

Estado y pronóstico de “El Niño” y “La Niña”




Figura 9. Pronóstico de probabilidad de ocurrencia del fenómeno ENOS.

De acuerdo con el pronóstico probabilístico de ENOS difundido por el IRI, en base a NOAA CPC, de mediados de octubre, se mantiene una probabilidad cercana al 100 % de condiciones El Niño durante los próximos meses, abarcando la primavera y el verano. Hacia mediados de 2027, los modelos muestran una disminución de esta probabilidad y un aumento de las posibilidades de transición hacia condiciones neutrales.