DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba

INFORME AGRONÓMICO

Agosto 2025

La Pampa. Cultivos de invierno sostienen el desarrollo, pero dependen de lluvias para no comprometer el rinde

Relevamiento del 25 al 31 de agosto

Los cultivos de invierno mantienen un estado general favorable en La Pampa, aunque persisten los síntomas de estrés hídrico y térmico. Las recientes lluvias sostuvieron el macollaje, pero la falta de nuevas precipitaciones en el corto plazo podría limitar el rendimiento.

Cultivos invernales 2025/26

LA PAMPA I Agosto

	Superficie sembrada (ha) [1]	Variación (%) interanual	Variación (%) histórica [2]	Superficie cosechable (ha) [3]	Avance de siembra (%)
TRIGO	363.600	0	+ 1	306.300	100
CEBADA	94.600	- 6	-	88.400	100
TOTAL	458.200			394.700	

1. Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.
2. Promedio histórico trigo 2019/20-2024/25
3. La diferencia entre superficie sembrada y cosechable corresponde a superficie destinada a cobertura.

www.bccba.org.ar

Hacia fines de agosto, la superficie proyectada de trigo y cebada se encontraba completamente implantada. En general, ambos cereales presentan una condición entre buena y excelente en la mayor parte del área relevada, aunque se registró un leve incremento en la proporción de lotes en estado regular a malo.

Al igual que en julio, cerca de la mitad de los reportes señalaron síntomas de estrés leve a moderado causados por falta de agua y heladas en ambos cultivos. Si bien las precipitaciones de agosto favorecieron los lotes en pleno crecimiento y macollaje, en trigo comienza a notarse la falta de agua y, de no producirse precipitaciones en los próximos días, podría repercutir directamente sobre el rendimiento. Hasta el momento el desarrollo del cultivo es favorable, aunque para sostener el potencial de rinde se estima necesaria una lluvia de al menos 40 milímetros en los próximos 10 a 15 días.

Cultivos invernales 2025/26

LA PAMPA I Agosto

Estado general



Evolución de la superficie en regular y mal estado (%)



Estado fenológico

Trigo



Cebada



Escala fenológica de referencia: Zadoks et. al.

www.bccba.org.ar

En cuanto al estado sanitario, tanto trigo como cebada se encuentran mayormente libres de plagas y enfermedades de relevancia. Solo se reportaron incidencias puntuales en baja intensidad: en la zona de General Pico se observaron casos de roya anaranjada (*Puccinia triticina*) en trigo y presencia de pulgón (*Schizaphis graminum*) en cebada, mientras que en Guatraché se detectó mancha amarilla (*Pyrenophora tritici-repentis*) en trigo y escaldadura (*Rhynchosporium secalis*) en cebada.

CONTEXTO CLIMÁTICO

Durante agosto, las precipitaciones mostraron una marcada heterogeneidad en la provincia. En aproximadamente la mitad de los departamentos relevados los acumulados superaron el promedio histórico, destacándose Realicó, Quemú Quemú y Trenel, donde se triplicaron los valores normales. En el resto del área, en cambio, las lluvias fueron similares o incluso inferiores a lo habitual. Esta disparidad se refleja en la recarga del perfil: los mayores niveles de agua útil se concentran en el sector norte, en tanto que hacia el centro y sur las reservas siguen siendo limitadas.



* Promedio histórico de los meses sin tener en cuenta el año seleccionado.



Fotos aportadas por colaboradores DIA

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS

bccba.dia@bccba.org.ar | +54 0351 4214164 – 4229637 Int. 1111