




INFORME AGRONÓMICO

Julio 2026



Santiago del Estero. Pese al recorte en las proyecciones,
la soja mantendría una producción récord

Relevamiento del 6 al 12 de julio

La nueva estimación mantiene a la soja con una producción cercana a los 5 millones de toneladas, consolidando un máximo histórico. El maíz duplicaría ampliamente el volumen obtenido en la campaña pasada, con una producción estimada de 3,4 millones de toneladas, mientras que el sorgo se ubicaría por debajo del ciclo anterior. Al momento del relevamiento, la cosecha avanzaba con algunas demoras y restricciones puntuales por anegamientos y falta de piso.



Durante los primeros días de julio, las estimaciones de rendimiento y producción de los cultivos que aún se encontraban en cosecha se ajustaron a la baja respecto de junio, consolidándose progresivamente los resultados de la campaña.


En soja, se prevé el cierre de una muy buena campaña, tanto en cantidad como en calidad de los granos, según lo referido por técnicos de la zona. Si bien las estimaciones de rendimiento y producción se ajustaron levemente respecto del informe anterior a medida que avanzó la cosecha, la producción alcanzaría un máximo histórico y el rendimiento sería el segundo más alto de la serie, apenas por debajo de la campaña 2018/19. Los mayores rindes, cercanos a 40 qq/ha, se reportaron en Quimilí, Tinajerayoj y Pueblo Pablo Torelo, mientras que en Bandera y Guardia Escolta rondaron los 20 qq/ha.

En maíz, el rendimiento y la producción superarían ampliamente los resultados de la campaña anterior, aunque permanecerían por debajo del promedio histórico. Los


mayores rindes alcanzaron entre 75 y 80 qq/ha en Tomás Young y Bandera, mientras que los menores, de entre 40 y 45 qq/ha, se registraron en Sachayoj, Quimilí y Colonia Alpina.

En sorgo, el rendimiento superaría al de la campaña anterior, pero no al promedio histórico, mientras que la producción se ubicaría por debajo de ambos valores. Los rindes oscilaron entre 50 qq/ha en Los Jurés y Roversi y 20 qq/ha en Guardia Escolta y Quimilí.

Respecto del avance de cosecha, la soja se encontraba prácticamente finalizada, mientras que el sorgo transitaba su etapa final, con demoras en Roversi debido a la elevada humedad de los granos. En ambos cultivos, el ritmo era levemente inferior al de la campaña pasada y al promedio histórico. En sectores de Tomás Young y Bandera, los anegamientos y la falta de piso demoraron las labores, quedando pendientes principalmente lotes o fracciones con presencia de agua. En maíz, el retraso era más marcado respecto de la campaña 2024/25 y de la media.




De cara a la próxima campaña, el Informe N.º 46 de la Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis* mostró una disminución general de las capturas respecto del relevamiento anterior. Sin embargo, la presencia del vector continuó siendo elevada en las regiones del NOA y NEA, que comprenden localidades de Santiago del Estero. En este contexto, los colaboradores informaron la presencia puntual de achaparramiento del maíz en localidades como Quimilí, Pozo Betbeder, Rapelli y Sachayoj. La incidencia fue variable entre zonas y fechas de siembra, y los casos se observaron principalmente en lotes tardíos. Ante este escenario, la Red destacó la importancia de mantener el monitoreo y controlar los maíces voluntarios, que pueden actuar como un puente verde y favorecer la supervivencia de la chicharrita entre campañas.



Contexto climático


Según datos del satélite GPM, las lluvias acumuladas durante junio presentaron una distribución heterogénea entre los departamentos de Santiago del Estero. Los mayores registros se observaron en Aguirre, Ojo de Agua y Guasayán, donde las precipitaciones superaron ampliamente el promedio histórico mensual. En otros sectores de la provincia también se registraron valores superiores a los habituales, mientras que en varios departamentos las lluvias se mantuvieron por debajo de la media. En las zonas con mayores acumulados, los excesos hídricos habrían contribuido a las demoras registradas en sectores puntuales.


Santiago del Estero: precipitaciones acumuladas (mm) año 2026 vs. promedio histórico 2015-2025*



* Promedio histórico de los meses sin tener en cuenta el año seleccionado.



Mapa de precipitaciones acumuladas (mm)





Según el Boletín Agrometeorológico Decádico del SMN, entre el 1 y el 10 de julio de 2026 las precipitaciones en Santiago del Estero fueron escasas o nulas.

Para el trimestre julio-agosto-septiembre, el pronóstico del SMN indica una mayor probabilidad de precipitaciones dentro de los valores normales y de temperaturas superiores a lo normal en toda la provincia.



Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS

bccba.dia@bccba.org.ar | +54 0351 4214164 – 4229637

La campaña en imágenes

