




INFORME AGRONÓMICO


Agosto 2026



Santiago del Estero. La preocupación por el maíz
reconfigura la superficie estival 2026/27

Relevamiento del 3 al 9 de agosto

La primera estimación de superficie para la campaña 2026/27 arrojó aumentos en soja, girasol y sorgo. El maíz reduciría su área reflejando la amenaza concreta de la chicharrita del maíz. En paralelo el ciclo 2025/26 se encamina a su cierre con una producción de maíz, que pese a las adversidades alcanzaría 4,7 millones de toneladas triplicando el volumen obtenido en el ciclo anterior.




En agosto se realizó la primera estimación de superficie estival para la próxima campaña. El sorgo presentaría el mayor incremento interanual, seguido por soja y girasol, mientras que el maní mantendría una superficie similar y el maíz registraría una disminución.

Entre los principales motivos de siembra, en soja se destacaron la rotación, el precio y la rentabilidad; en girasol, la humedad inicial del perfil, el pronóstico climático y la rentabilidad; y en maní, principalmente el precio y la rentabilidad. En el caso del maíz, la rotación fue el principal factor señalado, seguido por la preocupación por el complejo

de achaparramiento, la elevada presencia de chicharrita y los bajos rindes observados en algunas zonas. Esta situación favorecería el traslado de superficie desde maíz hacia soja, girasol y, especialmente, sorgo.


En cuanto al girasol, la siembra alcanzaba un avance del 22 %, evidenciando un retraso para la época debido a la falta de piso para ingresar a los lotes. De la superficie ya sembrada, gran parte se encontraba emergida.



A partir de la actualización de la superficie sembrada, estimada mediante imágenes satelitales, se ajustaron las proyecciones de producción de los principales cultivos. Para la soja, la producción proyectada mostró una disminución respecto de la estimación de julio. En el caso del maíz, la nueva estimación elevó la producción en más de un millón de toneladas, aun cuando el rendimiento promedio se redujo cerca de 3 qq/ha respecto de la estimación anterior. El rendimiento superaría al de la campaña anterior, aunque se ubicaría levemente por debajo del promedio histórico. Los resultados mostraron una marcada heterogeneidad, con valores que en Colonia Alpina variaron entre 45 y 75 qq/ha. Los mayores rendimientos, de hasta 90 qq/ha, se registraron en Bandera, mientras que los menores, cercanos a 42 qq/ha, se informaron en Weisburd, Tomás Young y Quimilí. Según los colaboradores, los rendimientos fueron inferiores a lo esperado, posiblemente debido a estrés hídrico y térmico y, según la zona, al complejo del achaparramiento del maíz.


En sorgo, el rendimiento también superaría al de la campaña anterior, pero permanecería por debajo del promedio histórico. Los valores oscilaron entre 50 qq/ha en Los Jurés y entre 13 y 22 qq/ha en Colonia Alpina y Pueblo Pablo Torelo. La producción, en tanto, se ubicaría por debajo de la registrada en la campaña anterior y del promedio histórico.

La falta de piso continuó demorando la cosecha. En sorgo, las labores estaban prácticamente finalizadas, mientras que el maíz presentaba retrasos respecto de la campaña anterior y del promedio histórico.




A partir del relevamiento propio de presencia de maíz voluntario, se identificó una mayor concentración de lotes con maíz guacho en el sudeste provincial. Su seguimiento resulta relevante en el marco del monitoreo de la chicharrita (*Dalbulus maidis*), ya que el maíz es su principal hospedante y fuente de alimento, por lo que puede contribuir a sostener poblaciones del vector entre campañas.

Algunos técnicos señalaron que el maíz voluntario aún no se había desarrollado debido al retraso en la cosecha, otros anticiparon que podría convertirse en un problema en las próximas semanas, dadas las condiciones de temperatura y humedad. En este contexto, será importante reforzar su monitoreo y control, particularmente en las zonas donde se concentra su presencia.





De cara a la próxima campaña, el Informe N.º 48 de la Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis* destacó una retracción poblacional de *D. maidis* durante la primera quincena de agosto. A pesar de esta tendencia general, las regiones del NOA y NEA (áreas endémicas de vector) y Centro-Norte (área de transición), continúan presentando mayores abundancias del vector, en comparación a igual periodo del 2025.




Contexto climático


Según datos del satélite GPM, las precipitaciones acumuladas durante julio presentaron una distribución heterogénea entre los departamentos de Santiago del Estero. Los mayores registros se observaron en Aguirre y Belgrano, donde los acumulados superaron el promedio histórico mensual. En otros sectores de la provincia también se registraron valores por encima de lo habitual, mientras que en varios departamentos las precipitaciones se mantuvieron por debajo de la media. En las zonas con mayores acumulados, los excesos hídricos habrían contribuido a demorar las labores de cosecha y siembra.



De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el trimestre agosto-septiembre-octubre de 2026 se mantienen probabilidades muy elevadas de desarrollo de una fase El Niño. Asimismo, hacia la primavera austral aumenta la probabilidad de que el evento alcance una intensidad fuerte o muy fuerte.



Para el trimestre agosto-septiembre-octubre, el pronóstico del SMN indica una mayor probabilidad de precipitaciones dentro de los valores normales y de temperaturas superiores a lo normal en toda la provincia.



Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS

bccba.dia@bccba.org.ar | +54 0351 4214164 – 4229637

La campaña en imágenes

