



INFORME AGRONÓMICO

Agosto 2026



Córdoba. La soja ganaría superficie y la incertidumbre por chicharrita vuelve a condicionar al maíz en 2026/27


Relevamiento del 3 al 9 de agosto

En agosto se realizó la primera estimación de superficie de cultivos estivales 2026/27. La soja sería el único cultivo con aumento interanual, pero requiere atención en la calidad de la semilla disponible. Maíz y girasol continuarían con siembras por encima de sus promedios históricos. La incertidumbre asociada a la chicharrita de maíz entre otros factores, recortaría interanualmente un 4% la siembra acercándose a las 3,4 millones de ha en 2026/27.

En agosto, el Departamento de Información Agronómica de la BCCBA realizó la primera estimación de superficie para los cultivos estivales de la campaña 2026/27. En términos generales, la intención de siembra muestra un incremento del área destinada a soja, mientras que para maíz, maní, girasol y sorgo se esperan reducciones respecto al ciclo anterior. Sin embargo, al comparar con los promedios históricos, maíz y girasol continuarían ubicándose por encima de los valores habituales, mientras que soja y maní permanecerían por debajo.



El precio y la rentabilidad esperada se destacaron como el principal factor en la decisión de siembra de todos los cultivos relevados, con una mayor incidencia en maní y girasol. La rotación tuvo mayor peso en soja y sorgo, mientras que el pronóstico climático adquirió mayor relevancia en maíz y girasol.





Entre los factores incluidos en la categoría “otros”, los comentarios de la red de colaboradores señalaron de forma recurrente la incertidumbre asociada a la presencia de *Dalbulus maidis* y al complejo del achaparramiento del maíz. Su incidencia sobre la decisión de siembra mostró un marcado gradiente espacial: las menciones se concentraron principalmente en departamentos del centro-norte y este provincial, donde fue señalado entre los factores determinantes para la planificación del cereal, mientras que hacia el sur y sudeste fueron prácticamente nulas. Esta situación estaría condicionando especialmente las siembras tardías y llevando, en algunas zonas, a evaluar el traslado de superficie hacia soja, sorgo o girasol. También se mencionaron, aunque con menor frecuencia, el costo de los fertilizantes, los arrendamientos y otras cuestiones vinculadas al manejo de los lotes.

Maíz guacho y chicharrita

En este contexto, también se relevó la presencia de maíz guacho en la provincia, debido a su importancia como alimento de *Dalbulus maidis* durante el período entre campañas. En términos generales, predominaron las categorías nula y baja, que concentraron cerca del 85% de las respuestas. Sin embargo, se observaron diferencias entre departamentos, con una mayor proporción de presencia media en sectores del centro-norte provincial, como Juárez Celman, Ischilín y Totoral, mientras que hacia el centro-sur predominaron ampliamente los niveles nulos y bajos.


La permanencia de plantas voluntarias adquiere especial importancia de cara a la próxima campaña, ya que puede favorecer la continuidad del denominado “puente verde” para la chicharrita. De acuerdo con el informe n°49 del 1 de septiembre de 2026 de la Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis*, hacia fines de agosto se observó una disminución en la abundancia del vector en las regiones Centro-Norte y Centro-Sur. Aun así, su seguimiento continúa siendo relevante durante la transición hacia la primavera y el inicio de las primeras siembras de maíz.






Calidad de semilla de soja

En cuanto a la calidad de la semilla de soja disponible para la campaña 2026/27, los análisis realizados por el Laboratorio de Semillas de la BCCBA evidenciaron un deterioro respecto al ciclo anterior. El 72% de las muestras alcanzó o superó un Poder Germinativo (PG) del 80%, frente al 87% registrado en la campaña previa. Esta disminución estuvo asociada principalmente a los excesos de precipitaciones ocurridos durante abril, que demoraron la cosecha y prolongaron la exposición de las semillas maduras a condiciones de elevada humedad, favoreciendo su deterioro.




Contexto climático

El invierno de 2026 se desarrolla bajo condiciones más húmedas, con precipitaciones que durante julio y agosto se ubicaron por encima del promedio histórico en toda la provincia. Esta mayor disponibilidad de agua contribuyó a la recarga de los perfiles de cara a las próximas siembras y también favoreció la emergencia y persistencia de maíces guachos en algunos sectores, un aspecto relevante dentro del contexto sanitario planteado para la próxima campaña.



Fuente: Red de estaciones meteorológicas BCCBA.

Para el trimestre septiembre-octubre-noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé para gran parte de Córdoba una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal, mientras que las temperaturas medias tenderían a ubicarse por debajo de los valores habituales. Este escenario se presenta en un contexto de condiciones El Niño actualmente establecidas y podría favorecer una buena disponibilidad hídrica durante el inicio de la campaña 2026/27, aunque su impacto final dependerá de la distribución temporal y espacial efectiva de las precipitaciones.



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Pronóstico climático trimestral septiembre-octubre-noviembre 2026.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS

bccba.dia@bccba.org.ar | +54 0351 4214164 – 4229637 Int. 1111