



INFORME AGRONÓMICO

Agosto 2026



La Pampa. La campaña invernal avanza con optimismo,
atenta a las lluvias de primavera y heladas tardías

Relevamiento del 24 al 30 de agosto

Las casi 250 mil ha de trigo y 44 mil ha de cebada estimadas para este ciclo mostraban buen estado general, con parte del trigo ingresando a su período crítico, sostenidas por buenas reservas de humedad. Lo que resta de la campaña dependerá de las lluvias de primavera y de la incidencia de heladas tardías en la etapa reproductiva.



Cultivos invernales 2026/27

LA PAMPA | Agosto



Estimación de superficie


	Superficie sembrada (ha) ¹	Variación		Superficie cosechable (ha) ¹
		interanual	histórica ²	
 TRIGO	247.000	- 3	- 28	242.200
 CEBADA	43.700	2	-	43.700
TOTAL	290.700			285.900

1. Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA. La diferencia entre superficie sembrada y cosechable corresponde a superficie perdida y/o destinada a cobertura.
2. Promedio histórico trigo: 2019/20 - 2025/26.


Período crítico:
Z3-Z6

Estado fenológico

Trigo




Cebada



Escala fenológica de referencia: Zadoks et. al.

Estado general



www.bccba.org.ar

Hacia fines de agosto, la mayoría de los lotes de trigo se encontraba en macollaje, con una fracción menor iniciando la elongación del tallo, el comienzo del período crítico del cultivo. Según técnicos de la zona, el estado general era excelente a bueno en casi la totalidad de la superficie. Se reportaron síntomas de estrés por heladas en varias zonas desde Caleufú, Embajador Martini, Trenel, Eduardo Castex, Conhelo, Dorila, Agustoni, Coronel Hilario Lagos, hasta Quehué y Jacinto Aráuz. El mayor impacto se dio en sectores bajos y los daños fueron principalmente foliares. Por su parte, el estrés hídrico no fue significativo, salvo por falta de


agua puntual en Caleufú y Jacinto Aráuz, y excesos en Coronel Hilario Lagos. El panorama sanitario se mantuvo despejado, con focos aislados de mancha amarilla (*Pyrenophora tritici-repentis*) en Macachín y Agustoni, y de pulgón en Caleufú, ambos de baja incidencia.




En cebada, más del 90% de la superficie presentaba condiciones excelentes a buenas. El estado fenológico es algo más atrasado que en trigo: poco menos de la mitad de los lotes estaba en macollaje, mientras que el resto se encontraba entre tres y cuatro o más hojas expandidas. No se reportó estrés relevante, con la excepción de falta de agua y heladas en Jacinto Aráuz y, en general, se refirió ausencia de plagas y enfermedades excepto un caso puntual de mancha en red (*Pyrenophora teres*) de baja incidencia.

Tablero interactivo – Últimas estimaciones disponibles BCCBA

Contexto climático

Las precipitaciones de agosto volvieron a superar el promedio histórico en toda la zona relevada, por tercer mes consecutivo. Esas reservas, acumuladas en el perfil, permitieron que los cultivos atravesaran el macollaje sin restricciones hídricas relevantes, con buen desarrollo vegetativo en la mayor parte de la región. Ahora deberán completarse con nuevas lluvias durante la primavera, a medida que los cultivos avancen hacia sus etapas de mayor demanda hídrica. Según el SMN, el trimestre septiembre-noviembre traería precipitaciones por encima de lo normal, aunque las temperaturas se ubicarían por debajo de lo normal, lo que pone el foco en la posible ocurrencia de heladas tardías durante la etapa reproductiva de los cultivos.





Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS

bccba.dia@bccba.org.ar | +54 0351 4214164 – 4229637

