



INFORME AGRONÓMICO

Septiembre 2026



Santiago del Estero. El girasol da inicio al ciclo 2026/27
y el maíz cierra la 2025/26 pese a las demoras

Relevamiento del 7 al 13 de septiembre


La campaña 2026/27 avanza con más del 80% del girasol sembrado y en buenas a excelentes condiciones. El maíz 2025/26 cerraría con una producción de 4,3 millones de toneladas, con demoras en la cosecha y proyectando un nuevo ciclo con 19% de recorte de área. El informe detalla la situación respecto al maíz voluntario en Belgrano y Moreno, relevante para el monitoreo de la chicharrita entre campañas.



Septiembre comenzó con más del 80 % de la superficie sembrada de girasol. Si bien el avance se ubicó por debajo del registrado a igual fecha de la campaña anterior, permaneció por encima del promedio histórico.

En términos generales, las perspectivas para la implantación son favorables, aunque con condicionantes locales. Colaboradores DIA, destacaron que en Quimilí, la evolución de los cultivos dependerá del aporte de precipitaciones durante la primavera,


necesarias para sostener una adecuada disponibilidad hídrica en el suelo durante las primeras etapas de desarrollo. Por otra parte, en Colonia Alpina las bajas temperaturas registradas ralentizaron la emergencia, al reducir la velocidad de germinación y el crecimiento inicial de las plántulas.



Las diferencias observadas en el avance de siembra también se reflejaron en el desarrollo fenológico del cultivo. En los departamentos Moreno y Alberdi se registraron los estadios más avanzados, con el cuarto y tercer par de hojas verdaderas, respectivamente. En el resto de los departamentos relevados predominó el estado V1, correspondiente al primer par de hojas de más de 4 cm de longitud.

Más allá de estas diferencias en el desarrollo, la condición general del cultivo se mantuvo entre excelente y buena en la mayor parte del área relevada. Únicamente en Colonia Alpina se reportaron síntomas leves de estrés asociados a las bajas temperaturas, sin observarse hasta el momento efectos de consideración en las restantes zonas.

En cuanto al estado sanitario, en gran parte del área relevada aún no se registraron plagas. En Belgrano se observó presencia media de oruga cogollera (*Spodoptera frugiperda*) y cortadoras; en Moreno, baja presencia de cortadoras, arañuela (*Tetranychus urticae*), gorgojo del girasol (*Listroderes costirostris*), orugas defoliadoras y medidora (*Rachiplusia nu*); mientras que en Rivadavia se reportó baja presencia de arañuela y gorgojo del girasol.




La cosecha de maíz 2025/26 finalizó con una demora inusual, extendiéndose en algunas zonas hasta fines de agosto y comienzos de septiembre. Los referentes de la zona reportaron que las abundantes precipitaciones durante el período de cosecha, la falta de piso, la elevada humedad del grano y los mayores costos de secado condicionaron el avance de las labores.

Los rendimientos mostraron una marcada variabilidad espacial y entre fechas de siembra, afectados por la combinación de estrés hídrico y térmico, quebrado y vuelco de plantas, enfermedades de caña y la incidencia del complejo del achaparramiento del maíz, asociado a la presencia de chicharrita, reportada previamente en la región. Los menores valores reportados se ubicaron entre 38 y 40 qq/ha en Bandera, Guardia Escolta, Colonia Alpina y Pampa de los Guanacos, mientras que los máximos alcanzaron 90 qq/ha en Bandera y 75 qq/ha en Quimilí. En términos generales, el rendimiento provincial cerraría por encima de la campaña anterior, aunque por debajo del promedio histórico. En este contexto, se alcanzaría un volumen de producción destacado, impulsado principalmente por el aumento del área sembrada, que superó en un 70 % a la registrada en la campaña 2024/25.


ACCESO A TABLERO DE ÚLTIMAS ESTIMACIONES AGRÍCOLAS DISPONIBLES - BCCBA

LINK: <https://www.bccba.org.ar/ultimas-estimaciones-agricolas-disponibles/>




En agosto se realizó el primer relevamiento de presencia de maíz voluntario, que permitió identificar las zonas con mayor concentración de lotes afectados hacia el sudeste de la provincia, aportando una primera referencia territorial para el seguimiento de la problemática.

En septiembre, un nuevo relevamiento permitió actualizar la situación, identificándose una mayor concentración de lotes con maíz guacho en los departamentos Belgrano y Moreno. Su seguimiento resulta relevante para el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), dado que la permanencia de plantas voluntarias puede actuar como puente verde y favorecer la persistencia del vector entre campañas.



Los técnicos indicaron que su presencia responde a situaciones diversas. En sectores de Belgrano, las demoras en la cosecha, el vuelco de plantas y la permanencia de espigas en superficie favorecieron nuevas emergencias, mientras que la escasez de

heladas permitió la supervivencia de plantas en lotes sin control. En Moreno y Alberdi también se observó nacimientos de distintas cohortes, asociados a la secuencia de cosecha y a condiciones de humedad favorables durante el otoño y comienzos de primavera. Parte de estos lotes comenzaba a ser controlada en preparación para las siembras de girasol y soja. En contraste, en zonas con menor disponibilidad hídrica, como Pampa de los Guanacos, la baja presencia de maíz voluntario estaría más asociada a limitaciones para su emergencia que a las prácticas de manejo. Además, los referentes remarcaron la importancia de mantener el monitoreo y realizar controles oportunos para reducir la persistencia de plantas hospedantes entre campañas.




Fuente: Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).


El Informe N.º 50 de la Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis* señaló una disminución de las poblaciones del vector durante la primera parte de septiembre. En el NOA, las capturas se desplazaron hacia categorías de menor abundancia, con predominio de 1 a 4 y de 5 a 20 adultos por trampa, que representaron el 27 % y 47 % de los casos, respectivamente. En el NEA también se observó una reducción, con presencia del vector en el 54 % de las localidades relevadas y predominio de bajas capturas: el 37 % correspondió a 1 a 4 adultos por trampa y el 12 % a 5 a 20 individuos.

Contexto climático


Según datos del satélite GPM, los mayores acumulados de precipitación se concentraron en el sudeste de la provincia, donde superaron ampliamente el promedio histórico. En otros sectores de la provincia también se registraron valores por encima de lo habitual, mientras que en varios departamentos las precipitaciones se mantuvieron por debajo de la media.



* Promedio histórico de los meses sin tener en cuenta el año seleccionado.




De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la capa arable se observan niveles bajos de agua útil principalmente en sectores del oeste y norte de la provincia. En el perfil del suelo, la disponibilidad de agua es mayor hacia el centro-sudeste, con los valores más bajos concentrados en sectores del oeste.




Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN) – Monitoreo de cobertura vegetal, suelos y agua.

El SMN, destaca que hay probabilidades del 100% de mantener la fase El Niño en el trimestre SON 2026. Respecto a la intensidad que pueda alcanzar este evento, las mayores chances son que sea muy fuerte.



Fuente: IRI.

Para el trimestre septiembre-octubre-noviembre, el pronóstico del SMN indicaría precipitaciones dentro de los valores normales y de temperaturas superiores a lo normal en toda la provincia.



Fuente: SMN.

La campaña en imágenes



Imágenes aportadas por la Red de Colaboradores DIA