



INFORME AGRONÓMICO


Septiembre 2026



La Pampa. La cosecha más lenta de maíz
cerró con una producción récord de 4,9 Mtn

Relevamiento del 28 de septiembre al 4 de octubre

Después de la cosecha más lenta de la serie, el maíz cerró con 4,9 Mtn, la mayor producción registrada, y llevó la campaña estival 2025/26 a casi 7 millones. Los rindes superaron lo esperado, y un septiembre más seco permitió terminar la trilla en los lotes que habían quedado rezagados.



Con el relevamiento de fines de septiembre, la cosecha de maíz llegó prácticamente a su fin, luego de una campaña en la que la labor avanzó al ritmo más bajo de la serie. Según los técnicos zonales, la humedad del grano demoró el inicio de la trilla, pero una vez que pudo cosecharse los resultados superaron lo esperado. La nueva estimación de producción se ubicó por encima de la de agosto, con un aumento del rinde promedio provincial de cerca de un quintal, y la campaña cerró como la de mayor volumen de la serie, ubicándose un millón y medio de toneladas por encima del promedio histórico.

Tablero interactivo – Estimaciones por departamento

Referentes locales destacaron el desempeño de los maíces tardíos de primera, con valores de hasta 95 y 100 qq/ha en Intendente Alvear, Vértiz, Mauricio Mayer y General Pico, aunque en otras zonas de Quemú Quemú rindieron por debajo de lo proyectado. Los maíces de segunda rindieron menos: en Conheló, Winifreda y Pichi Huinca, el perfil seco que dejaron los cultivos invernales y las escasas lluvias estivales limitaron su desarrollo, y en otras zonas también influyeron las heladas y la seca de diciembre. En el noreste, en Vértiz, Intendente Alvear,



Realicó, Speluzzi y General Pico, los bajos anegados por las lluvias entre junio y agosto impidieron cosechar parte de los lotes.



Campaña estival 2025/26


LA PAMPA | Septiembre

Participación y rinde por fecha de siembra



Valores provisionarios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.

Avance de cosecha vs rango histórico




www.bccba.org.ar

Elaboración del DIA-BCCBA a partir de la Red de Colaboradores

Respecto del maíz guacho, la presencia fue nula a baja en toda la zona relevada, ya que las heladas impidieron la emergencia o eliminaron las plántulas nacidas, con algunos primeros brotes en sectores puntuales. En ese escenario, el Informe N°50 de la Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis* no registró capturas de chicharrita en ninguna de las trampas de la provincia durante la primera quincena de septiembre. De cara a la nueva campaña, la baja presencia de maíces voluntarios y la ausencia del vector son señales favorables, aunque la Red mantiene como prioridad el control de los guachos y el monitoreo desde la emergencia de los primeros maíces

Contexto climático

Las precipitaciones acumuladas durante septiembre se ubicaron por debajo del promedio histórico en gran parte de la provincia, excepto en Guatraché y Hucal. Este régimen más seco favoreció el cierre de la trilla en los lotes que habían quedado rezagados por las lluvias de los meses anteriores.



* Promedio histórico de los meses sin tener en cuenta el año seleccionado.

Elaboración del DIA a partir de la Red de Estaciones Meteorológicas de la BCCBA

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS

bccba.dia@bccba.org.ar | +54 0351 4214164 – 4229637