



INFORME AGRONÓMICO

Septiembre 2026



La Pampa. Heladas y falta de agua
condicionan a trigo y cebada en el período crítico

Relevamiento del 28 de septiembre al 4 de octubre


Sobre casi 250 mil ha de trigo y 44 mil ha de cebada estimadas, septiembre dejó cultivos más resentidos, en especial la cebada. Con el período crítico en marcha, las lluvias esperadas y el estado sanitario serán determinantes.



Hacia fines de septiembre trigo y cebada transitaban el período crítico bajo un contexto condicionado por las heladas y la falta de agua, que se tradujo en un deterioro del estado general respecto de agosto. Según técnicos zonales, casi nueve de cada diez reportes en trigo indicaron síntomas de estrés térmico por heladas, en niveles de leves a altos, y cerca de ocho de cada diez refirieron estrés hídrico. Las heladas de fines de agosto y mediados de septiembre frenaron el desarrollo del cultivo, y en el centro-norte se reportó quemado de hojas por la combinación con el período seco previo. Los daños más severos fueron puntuales, llegando a informarse pérdidas de hasta 30% de la superficie en lotes sembrados temprano en Agustoni.

Según referentes locales, la cebada fue más afectada por las bajas temperaturas. La gran mayoría de los reportes indicó daños por heladas, con quemado generalizado del follaje, necrosis de tejidos y, en algunos casos, muerte de macollos. En ambos cultivos, resta evaluar la capacidad de recuperación y la incidencia de estos daños sobre el rendimiento potencial. Su evolución dependerá del estado de los tejidos y órganos afectados, de la emisión de nuevo crecimiento y de las condiciones ambientales de las próximas semanas.

Tablero interactivo – Últimas estimaciones disponibles BCCBA




Elaboración del DIA-BCCBA a partir de la Red de Colaboradores.

En sanidad, la presión fue baja. Se observó mancha amarilla (*Pyrenophora tritici-repentis*) y, con muy baja incidencia, roya anaranjada (*Puccinia triticina*) en trigo, y mancha en red (*Pyrenophora teres*) y escaldadura (*Rhynchosporium secalis*) en cebada. Sin embargo, ante la perspectiva de lluvias recurrentes y los cultivos en período crítico, los técnicos advirtieron un mayor riesgo de roya amarilla (*Puccinia striiformis*) y de mancha amarilla.


Contexto climático

Tras tres meses consecutivos con precipitaciones por encima de lo normal, las de septiembre fueron inferiores al promedio histórico en casi toda la provincia, con déficits más marcados en el norte y noreste. A principios de octubre, el agua útil en el perfil mostraba valores bajos a moderados, con mayor déficit hacia el norte y el oeste, lo que coincide con el estrés hídrico reportado. El pronóstico trimestral del SMN anticipa lluvias superiores a lo normal, un escenario favorable para recomponer reservas, aunque también para el desarrollo de enfermedades foliares. Las temperaturas inferiores a lo normal mantendrían abierta la posibilidad de nuevas heladas.

La Pampa: precipitaciones acumuladas (mm) año 2026 vs. promedio histórico 2015-2025*




Mapa de precipitaciones acumuladas (mm)






* Promedio histórico de los meses sin tener en cuenta el año seleccionado.

Elaboración del DIA a partir de datos del satélite GPM.

Agua útil en la capa arable



Agua útil en el perfil

Tomado de Agua útil porcentual en la capa arable y en el perfil, al 03/10/2026 (modelo BHOA), por Servicio Meteorológico Nacional, 2026
https://www.smn.gov.ar/monitoreo_estadosPronóstico de Precipitación
Octubre-Noviembre-Diciembre 2026Pronóstico de Temperatura
Octubre-Noviembre-Diciembre 2026



Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

 **B C C B A**
Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS

bccba.dia@bccba.org.ar | +54 0351 4214164 – 4229637