DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba



INFORME AGRONÓMICO

Octubre 2026



La Pampa. El trigo apunta
a la segunda mayor producción de la serie

Relevamiento del 26 de octubre al 1 de noviembre


Con los cultivos recuperados tras las lluvias, la primera estimación proyecta 750 mil toneladas de trigo y 139 mil de cebada. Con el período crítico todavía en curso, la sanidad y las condiciones de noviembre serán determinantes para el rinde final.



Según la primera estimación, se proyectan 750 mil toneladas de trigo, la segunda mayor producción de la serie. A pesar de que la superficie sembrada con el cereal se sitúa cerca de 30% por debajo del promedio histórico, el rinde promedio estimado para este ciclo, lo supera en más de 9 quintales. El rango de rindes fue amplio: el máximo de 40 qq/ha se informó en General Pico, mientras que el mínimo, de 18 qq/ha se reportó en Alta Italia.

En cebada, la producción estimada resultó inferior a la de la campaña anterior, principalmente debido a un rendimiento menor al excepcional registrado en el ciclo pasado, aunque todavía por encima del promedio histórico. Los rindes variaron entre 25 qq/ha en Jacinto Araúz, Macachín y Dorila y 45 qq/ha en General Pico y Villa Mirasol.

Tablero interactivo – Últimas estimaciones disponibles BCCBA




Elaboración del DIA-BCCBA a partir de la Red de Colaboradores.


Según técnicos zonales, los lotes se recuperaron notablemente con las lluvias de fines de septiembre y octubre y sólo una cuarta parte de los reportes en trigo refirió síntomas de estrés hídrico. Las heladas, en cambio, dejaron secuelas dispares: se informó pérdida de macollos y, en Agustoni, también de espigas y de lotes sembrados temprano, mientras que, en Intendente Alvear, el daño fue mínimo y se concentró en las siembras de mayo y primera quincena de junio. En el noreste y el este, además, se reportaron excesos de agua con pérdidas por anegamiento de hasta 15% de la superficie en Vértiz, y se señaló que los días nublados y frescos de octubre limitaron el crecimiento durante el período crítico.

La sanidad pasó a ser el principal foco de atención. Cerca de la mitad de los reportes en trigo mencionó roya amarilla (*Puccinia striiformis*), con incidencia media a alta en buena parte del centro-norte y el este. También se observaron roya de la hoja (*Puccinia triticina*), de incidencia baja a media, mancha amarilla (*Pyrenophora tritici-repentis*) y pulgones (*Schizaphis graminum*, *Sitobion avenae* y *Sipha maydis*), principalmente de incidencia media. En cebada se observaron mancha en red (*Pyrenophora teres*) y ramularia (*Ramularia collo-cygni*), de incidencia media, y roya de la hoja (*Puccinia hordei*), de incidencia baja. Los técnicos vincularon la mayor presión de enfermedades con la elevada humedad y la nubosidad.

Contexto climático


Las precipitaciones de octubre superaron el promedio histórico en toda la provincia, con excedentes más marcados en el centro. Al 31 de octubre, el agua útil en el perfil mostraba valores bajos a moderados, en un momento de alta demanda de los cultivos. El pronóstico trimestral del SMN (noviembre-enero) anticipa lluvias superiores a lo normal y temperaturas inferiores a lo normal, un escenario favorable para el llenado de granos, aunque también para la persistencia de enfermedades foliares.






* Promedio histórico de los meses sin tener en cuenta el año seleccionado.

Elaboración del DIA a partir de datos del satélite GPM.



Tomado de Agua útil porcentual en la capa arable y en el perfil, al 31/10/2026 (modelo BHOA), por Servicio Meteorológico Nacional, 2026
https://www.smn.gob.ar/monitoreo_estados





Imágenes aportadas por la Red de Colaboradores DIA

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS

bccba.dia@bccba.org.ar | +54 0351 4214164 – 4229637